

NUEVO

ReactiX[®]
Loxoprofeno

**Reactiva venciendo
el Dolor e Inflamación¹**



EFICAZ Y
POTENTE

**HASTA 20 VECES MÁS
POTENTE QUE OTROS AINEs.¹**

- Mayor analgesia que ibuprofeno, indometacina, naproxeno, piroxicam y meloxicam.²
- Mayor efecto antiinflamatorio que ketorolaco.²



SELECTIVO

ReactiX[®] AINE IDEAL:
Loxoprofeno

BLOQUEO SELECTIVO A COX-2.¹

Reactix[®] tiene poca interacción con COX-1
y alta afinidad a COX-2.¹



SEGURO

SEGURIDAD GÁSTRICA PRO-SELECTIVA.^{1,3}



POR SER PRO-FÁRMACO

Seguro a largo plazo por
su metabolismo y absorción
gastrointestinal.¹



POR SER SELECTIVO A COX-2:

Menor efecto en la
mucosa gástrica.³

RÁPIDO

ReactiX[®] SE ABSORBE
Loxoprofeno

RÁPIDA Y UNIFORMEMENTE.¹

Acción a los **15 minutos** de su administración.¹



ReactiX[®] está indicado como antiinflamatorio y analgésico en el tratamiento de:¹

Loxoprofeno



Procesos inflamatorios osteomusculares del cuello, hombro, brazo, lumbalgias.



Procesos inflamatorios agudos del tracto respiratorio superior (acompañados o no de bronquitis aguda).



Postcirugía, postraumático y postexodoncia.

ReactiX[®] SE ADMINISTRA¹

Loxoprofeno



Se recomienda la posología de 1 a 2 tabletas (60 a 120 mg) dosis única, si los síntomas son muy intensos.¹

NUEVO

ReactiX[®]

Loxoprofeno

Reactiva venciendo el Dolor e Inflamación¹



No. de Registro: 370M2023 SSA IV

Referencias: 1. Información para prescribir, Reactix[®] (loxoprofeno). 2. Kassian Rank A. Los Analgésicos Antiinflamatorios No Esteroides. *Foro de Investigación y Tratamiento del Dolor para la Comunidad Médica* 2002; 1 (2): 5-10. 3. Yamakawa N, Suemasu S, Kimoto A, et al. Low direct cytotoxicity of loxoprofen on gastric mucosal cells. *Biol Pharm Bull* 2010;33(3):398-403.

No. de Aviso: 2401022002C00080

Material dirigido al profesional de la salud


CHINOÏN[®]