

GangC^{tri}

rivaroxabán

El **Inhibidor oral** del **Factor Xa** que, con respecto a warfarina:



- **Reduce** en un **21% el riesgo** de *EVC y embolias sistémicas¹.
- **Disminuye** en un **31% el riesgo** de sangrado crítico¹.
- **Rivaroxabán** mostró una **reducción del 50%** en el riesgo de sangrado fatal¹.
- **Disminución** del **33% en la incidencia** de hemorragias intracraneales¹.

*EVC: Evento Vascular Cerebral.

GangC^otri

rivaroxabán

DALE **GC**
A CADA **LATIDO**

Está **indicado para** pacientes con **fibrilación auricular no valvular**, para la prevención de eventos vasculares cerebrales (EVC) y embolismos sistémicos.²

Dosis²:

Se debe de tomar **1 tableta de 20mg una vez al día con alimentos.**

En **pacientes con Insuficiencia Renal Moderada** (depuración de creatinina [DRC]: <50-30 mL/min) la dosis recomendada es de **15mg una vez al día.**



Material exclusivo para el Profesional de la Salud
Reg.No. 275M2023 SSA IV
No. de Aviso: 2501022002C00049

Referencias: 1. Patel, M. R., Mahaffey, K. W., Garg, J., Pan, G., Singer, D. E., Hacke, W., & ROCKET AF Investigators. (2011). Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. New England Journal of Medicine, 365(10), 883-891. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1009638> 365(10), 883-891. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1009638> Nota: Datos obtenidos de Supplementary appendix tabla 4. 2. Información para prescribir Gangotri® ff. tableta.