


PilefhiD®

LORATADINA+BETAMETASONA


««« Rápido control de los síntomas alérgicos severos »»»¹⁻⁴



PilefhiD®

LORATADINA+BETAMETASONA

Beneficios



Rápido inicio de acción a los 30 minutos.^{1,4}



Efecto prolongado durante 24 horas.^{1,4}



Control de los síntomas de la reacción alérgica²⁻⁴ con dosis bajas de corticoesteroides.³

Tratamiento de corto plazo de las exacerbaciones alérgicas severas^{2,3}

Control
de los síntomas
severos por alergia²⁻⁴



Adultos y niños mayores de 12 años de edad:
Una tableta dos veces al día, cada 12 horas!

Referencias: 1. Información para prescribir amplia PilefhiD. Laboratorios Chinoin. 2. Mendoza T, Sánchez F. Clinical Efficacy and Safety of a Combined Loratadine-Betamethasone Oral Solution in the Treatment of Severe Pediatric Perennial Allergic Rhinitis. WAO Journal.2009; 2:49-5. 3. Snyman JR, Potter PC, M Groenewald M. et al. Effect of betamethasone-loratadine combination therapy on severe exacerbations of allergic rhinitis: a randomized, controlled trial. Clin Drug Investig. 2004;24(5):265-74. 4. De Alba L, Elizondo A, Sánchez P. Estudio abierto, comparativo y prospectivo entre la combinación de Betametasona 0.25mg/Loratadina 5 mg tabletas y maleato de clorfeniramina 8 mg grageas de liberación prolongada en pacientes con urticaria aguda moderada y severa. Rev Cent Dermatol Pascua.2000; Vol. 9: No. 1. Pp. 43-48.

Registro No. 101M2021 SSA IV Material de uso exclusivo para el profesional de la salud.

Aviso de Publicidad No. 2401022002C00183

95479

CHININ®