

Ante la **CONTRACTURA¹**

Regresa a la **calm-A** con

Mydocalm-A®

Tolperisona + Paracetamol



» Eficaz Analgésico y Relajante Muscular.^{1,2}

Seguridad y Eficacia SIN Sedación.^{1,3}



Devuelve la libertad de movimiento para
continuar con las actividades diarias.^{2,3}



CHINOIN®

MENORES EFECTOS ADVERSOS que otros relajantes musculares.⁴

Indicaciones:²

**CONTRACTURAS, ESPASMOS,
TORCEDURAS, LUMBAGO Y
TORTÍCOLIS.**



Dosis:

**1 CÁPSULA
CADA 8 HORAS.²**



Reg. No. 234M83 SSA IV

Caja con 30 CÁPSULAS.²

Material exclusivo para el profesional de la salud. No. de Aviso: 2301022002C00180

Referencias: 1. Flores J, Morales J, et al. Eficacia y seguridad de Tolperisona 50 mg y paracetamol 300 mg. Estudio clínico en fase IV. *Federación de Sociedades y Asociaciones Latinoamericanas de Ortopedia y Traumatología*. 2017; 2(2): 1-7. 2. Información para prescribir Mydocalm-A®. 3. Dulin J, Kovács L, Ramm S, et al. Evaluation of sedative effects of single and repeated doses of 50 mg and 150 mg tolperisone hydrochloride. Results of a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Pharmacopsychiatry*. 1998;31(4):137-42. 4. Quasthoff S, Möckel C, Ziegglänsberger W, et al. Tolperisone: a typical representative of a class of centrally acting muscle relaxants with less sedative side effects. *CNS neuroscience & therapeutics*. 2008 ;14(2):107-19.

